

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO

Idade	Vacina	Dose	Doenças evitadas
Ao nascer	BCG-ID	Dose única	Formas graves de tuberculose
	Hepatite B (1)	1ª dose	Hepatite B
1 mês	Hepatite B	2ª dose	Hepatite B
2 meses	Tetraivalente (DTP + Hib) (2)	1ª dose	Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pela Haemophilus influenzae tipo B
	Rotavírus	1ª dose	Rotavírus
	Sabin	1ª dose	Paralisia infantil ou poliomielite
3 meses	Pneumo 10	1º dose	Meningites e doenças graves causadas pelo pneumococo
	Meningo C	1º dose	Meningites e meningococcemias causadas pelo meningococo do tipo C
4 meses	Tetraivalente (DTP + Hib)	2ª dose	Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pela Haemophilus influenzae tipo B
	Rotavírus	2ª dose	Rotavírus
	Sabin	2ª dose	Paralisia infantil ou poliomielite
5 meses	Pneumo 10	2º dose	Meningites e doenças graves causadas pelo pneumococo
	Meningo C	2º dose	Meningites e meningococcemias causadas pelo meningococo do tipo C
6 meses	Tetraivalente(DTP + Hib)	3ª dose	Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pela Haemophilus influenzae tipo B
	Hepatite B	3ª dose	Hepatite B
	Sabin	3ª dose	Paralisia infantil ou poliomielite
7 meses	Pneumo 10	3º dose	Meningites e doenças graves causadas pelo pneumococo
12 meses	SRC (tríplice viral)	1ª dose	Sarampo, rubéola e caxumba
	Meningo C	Reforço	Formas mais graves de meningite bacteriana
15 meses	Sabin	1ª reforço	Paralisia infantil ou poliomielite
	DTP (tríplice bacteriana)	1ª reforço	Difteria, tétano e coqueluche
	Pneumo 10	Reforço	Meningites e doenças graves causadas pelo pneumococo
4 anos	SRC (tríplice viral)	Reforço	Sarampo, rubéola e caxumba
	DTP (tríplice bacteriana)	2º reforço	Difteria, tétano e coqueluche
	Sabin	2ª reforço	Paralisia infantil ou poliomielite

(1): A primeira dose contra a hepatite B deve ser administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido. O esquema básico se constituiu em três doses, com intervalo mínimo de 30 dias da primeira para a segunda dose e 180 dias da primeira para a terceira

(2): O esquema de vacinação atual é feito aos 2, 4 e 6 meses de idade com vacina tetraivalente e dois reforços com a tríplice bacteriana (DTP). O primeiro reforço é aos 15 meses e o segundo aos 5 anos

(3): A vacina contra febre amarela está indicada para crianças a partir dos 9 meses de idade que residem ou viajarão para área endêmica (Estados AC, AP, AM, DF, GO, MA, MT, MS, PA, RO, RR e TO), área de transição (alguns municípios dos Estados BA, MG, PR, PI, RS, SC e SP) e área de risco potencial (alguns municípios dos Estados BA, ES e MG). Se viajar para áreas de risco, vacinar contra febre amarela com pelo menos 10 dias de antecedência