

# PREVENÇÃO E CONTROLE DE RAIVA DOS HERBÍVOROS

(BOVINOS E BUBALINOS)



**"Prevenção é a melhor proteção"**




viva a  
nossa cidade

# O que é a raiva?

A raiva é uma zoonose (doença que é transmitida dos animais ao homem e vice-versa) transmitida por um vírus mortal tanto para o homem como para o animal. Envolve o sistema nervoso central, levando ao óbito após curta evolução.

## Transmissão

A transmissão ocorre quando os vírus da raiva existentes na saliva do animal infectado penetram no organismo através da pele ou de mucosas, por meio de mordedura, arranhadura ou lambedura. Todos os mamíferos podem transmitir e ser acometidos pela doença, sendo o principal transmissor o morcego hematófago *Desmodus rotundus*. O morcego doente elimina o vírus pela saliva quando se alimenta de sangue dos animais, ou dos seres humanos.



## Formas de Prevenção

A melhor forma de prevenção é a vacinação. Em bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e equinos com idade igual ou superior a 3 meses deve se aplicar uma primeira dose, repetir após 30 dias e depois uma vez anualmente. Em cães e gatos é aplicada uma única dose anual.

Além disso, o produtor pode agir a fim de controlar a população de morcegos transmissores fazendo a limpeza e iluminação de locais que podem ser utilizados como moradia pelo morcego, assim como dificultar o acesso do animal a esses locais, uso de pasta vampiricida em animais agredidos pelo morcego hematófago e acionamento do controle de zoonoses para captura dos morcegos.

## Sintomas

- Isolamento do restante do rebanho;
- Tristeza;
- Tremores musculares;
- Perda de peso;
- Salivação intensa;
- Falta de coordenação - dificuldade de permanecer em pé, andar cambaleante, quedas e dificuldades para levantar-se;
- Paralisia dos membros posteriores